

NEPTIS KEYENSIS n. sp.

DOOR

W. J. A. KLUNDER VAN GIJEN.

Met Plaat 4.

Voor eenigen tijd kwamen mij eenige exemplaren in handen eener Neptis-soort, afkomstig van de Key-eilanden; ik dacht eerst *N. Polion* Grose-Smith (Rhop. Exot. Vol. 3. pl. 4) voor mij te hebben, doch na eenige beschouwing bleek, dat er punten van verschil bestonden, voornamelijk in teekening en kleur. *Polion* Grose-Smith, die volgens zijn opgaaf afkomstig is van Boeroe, is geheel donker bruin gekleurd, terwijl het ♂ zwartachtig bruin is. De teekening is geelachtig wit of geel. Aan den achterrand der voorvleugels zijn geen 2 kleine vlekjes, terwijl de 5 duidelijke geelwitte vlekken in de voorvleugelpunt slechts door 2 lichtblauwe zijn aangegeven. De achtervleugels zijn bij *Polion* chocolade-bruin, bij *Keyensis* zeer donker bruin tot zwartachtig bruin, terwijl de witbruinachtige teekening, zooals *Polion* haar vertoont, hier lichtblauw is (♂) en zeer lichtgrijs (♀).

Het ♀ dezer nieuwe soort vertoont meerdere verschillen met *Polion*, terwijl op de voorvleugels, evenals bij het ♂, tegen den achterrand de 2 vlekjes ontbreken en bij de punt dezer vleugels zijn de 2 rijen witbruinachtige vlekjes minder duidelijk, terwijl die, welke meer naar den rand gelegen zijn, geheel ontbreken. Ten slotte merk ik nog als verschil op, dat de

golving der voor- en achtervleugels niet zoo ontwikkeld is als bij *Polion*.

De onderzijde van het ♂ is bij deze nieuwe soort niet roodachtig, zooals Grose-Smith bij *Polion* (l.c. p. 14) opgeeft, doch grijsachtig bruin, terwijl de teekening tegen den rand der achtervleugels onduidelijk is aangelegd, door gelijkkleurigheid met de grondkleur. Het lichtblauwachtige der vlekken van de bovenzijde schemert door. Overigens zijn er geen verschillen met *Polion*, terwijl ook de vlucht dezelfde is.

Thans ga ik over tot eene beschrijving der nieuwe soort. Sprieten, kop en thorax als bij *Polion*, doch bij ♂ en ♀ donkerder gekleurd. Voorvleugels zwart of zwartbruin en bij het ♀ bruinzwart; op ongeveer $\frac{1}{3}$ van de voorvleugellengte vanaf den wortel komen 2 witte vlekken voor, bij het ♂ 2 blauwe: deze zijn in tint nogal verschillend, doch bij de ♀♀ vrij zuiver wit. Tegen den voorrand komen 2 grootere vlekken voor, waarvan de bovenste gewoonlijk grooter is; meer naar beneden heeft men weder 2 dergelijke vlekken, doch grooter en opgericht. De plaatsing dezer vlekken in de cellen is nagenoeg gelijk aan die van *Polion*, zoodat ik ze hier niet zal noemen. Tegen den achterrand komen iets onder de vleugelpunt 2 kleine lichtblauwe vlekken te voorschijn, terwijl bij het ♀ een dubbele rij witachtig bruine langs den geheelen achterrand te zien is; bij het ♂ is deze teekening zoo goed als onzichtbaar. De rand der voorvleugels is wit en zwart gekleurd.

Achtervleugels bij het ♂ zwart en die van het ♀ zeer donkerbruin. Op deze komt eene vlekkenrij voor, welke op ongeveer $\frac{1}{3}$ van den wortel begint en flauw tegen den voorrand gebogen is; op ongeveer $\frac{4}{5}$ van den wortel komt bij ♂ en ♀, doch van het eerste bijna onzichtbaar, eene samensmeltende vlekkenrij voor, welke bijna een band vormt, waarin lichtere puntjes te zien zijn, vooral tegen den voorrand; onder deze band bevindt zich een dergelijke, 2^{de}, doch zeer donker en

daardoor onduidelijk. De rand dezer vleugels is bij het ♀ wit en zwart gekleurd, bij den ♂ effen zwart of donker bruin.

De onderzijde is bij beide seksen ongeveer gelijk, doch bij het ♀ donkerder; kleur chocolade-bruin; de teekening der bovenzijde schemert door; de dwarsband van het ♀ op de achtervleugels (zie pl. 4) is duidelijker en lichter van kleur en vertoont tusschen elke ader eene onderbreking; de derde of laatste langsstreep, die op de bovenzijde niet voorkomt, loopt tegen den voorrand met de 2^{de} samen; bij het ♂ is deze 3^{de} langsstreep door enkele kleine puntjes aangeduid.

Het abdomen is op de onderzijde bleekgeel; de voorpooten witachtig; achterpooten evenals de vleugels gekleurd, doch met wat grijswit doormengd; palpen grijsachtig.

Van deze soort bevinden zich 5 exemplaren in mijne collectie, welke afkomstig zijn van den Heer Tamson, te 's-Gravenhage.

N A S C H R I F T.

In het Museum te Leiden bevinden zich enkele exemplaren eener Neptis-soort, welke niet benoemd zijn en wel overeenkomst vertoonen met deze soort, doch naar mijne meening toch niet dezelfde kunnen zijn, daar bij nadere beschouwing verschillen te bemerken zijn. De in het Museum aanwezige exemplaren zijn afkomstig van de Aroe-eilanden.